

FICHE D'IDENTITÉ

Composition et mode d'action

Pyroxsulame^(*) 68.3 g/kg Triazolopyrimidine HRAC B Inhibiteur de l'ALS	Florasulame^(*) 22.8 g/kg Triazolopyrimidine HRAC B Inhibiteur de l'ALS	Cloquintocet-mexyl^(**) 68.3 g/kg Safener
Formulation		WG (granulés dispersables)
ZNT		5 m
DRE		48 heures après traitement
Classement		H317, H351, H373, H410
Conditionnement		Bidons de 0,55 kg et 3 kg

UTILISATIONS

Culture	Dose	Stade	Période	Précisions
Blé tendre et blé dur d'hiver Triticale Seigle d'hiver	275 g/ha	Début tallage à 2 nœuds	De janvier à avril	Ne pas dépasser 275 g/ha par campagne
Lutte contre les bromes	Application fractionnée possible de 2 demi-doses à moins de 3 semaines d'intervalle			
Prévention des résistances	L'utilisation des inhibiteurs d'ALS antigraminée doit être limitée à 1 seule application par campagne			

Octogon™

HERBICIDE CÉRÉALES

COMPOSITION ET CLASSIFICATIONS :

Octogon™ : Granulés dispersables (WG), contenant 68.3 g/kg de Pyroxsulame* + 22.8 g/kg de Florasulame* + 68.3 g/kg de Cloquintocet-mexyl*** • AMM n° 2090042 - Dow AgroSciences S.A.S. • Danger - H317, H351, H373, H410.

Kerb Flo™ : Suspension concentrée (SC), contenant 400 g/L de Propyzamide*. AMM n° 8400574 - Dow AgroSciences S.A.S. Attention - H351, H412.

Responsable de la mise sur le marché : Dow AgroSciences Distribution S.A.S. 371, Rue Ludwig Van Beethoven - 06560 Valbonne • N° d'agrément PA00272 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. • *Substances actives brevetées et fabriquées par Dow AgroSciences • ™ Marque de The Dow Chemical Company (Dow) ou d'une société affiliée.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.

DOW Dow AgroSciences

N° Vert 0 800 470 810
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



Dow AgroSciences



La connexion large spectre

Octogon™

HERBICIDE CÉRÉALES ANTIGRAMINÉE ET ANTIDICOTYLEDONE

Solutions for the Growing World

Solutions for the Growing World - Solutions pour un monde en croissance - Novembre 2015

Octogon™



EFFICACE CONTRE LES + NUISIBLES
*Vulpin, Ray-Grass, Brome, Folle Avoine,
 Pensée, Coquelicot, Géranium, Gaillet*

LES CLÉS D'UN DÉSHERBAGE CÉRÉALES RÉUSSI



• Agronomie non chimique

Réduire les populations adventices en utilisant le travail du sol, la date de semis, la rotation...



• Traiter en séquence

Positionner **Octogon™** après l'utilisation à l'automne d'un herbicide antigraminée racinaire.



• Traiter tôt

Les interventions réalisées sur des adventices jeunes (avant mi-tallage) donnent de meilleurs résultats.



• Utiliser des adjuvants

L'ajout d'adjuvants recommandés⁽¹⁾ facilite la pénétration de **Octogon™** et augmente l'efficacité finale.⁽²⁾



• Traiter en Association

Associer à **Octogon™** un autre herbicide antigraminée permet d'améliorer et de sécuriser le niveau d'efficacité du désherbage de sortie d'hiver. Nous consulter.⁽¹⁾



• Alternier les modes d'action

Utiliser **Kerb Flo™** dans un colza permet :

- d'introduire un autre mode d'action herbicide (HRAC K1) efficace sur vulpin, ray-grass et brome,
- de réduire significativement la population de graminées dans le blé suivant.

LES ATOUTS "CONNECTÉS"

● **Une dose unique contre toutes les graminées**
 Dose unique : 275 g/ha.
 Haut niveau d'efficacité sur ray-grass, vulpin, folle avoine.
 La référence contre les bromes.

● **Efficace aussi contre les dicotylédones**
 Les + communes : véronique, gaillet.
 Les + difficiles : géraniums, ombellifères.

● **Libre rotation**
 Sans souci pour les cultures suivantes et intermédiaires, y compris colza et betteraves⁽³⁾.

⁽³⁾ Pour les cultures légumières ou florales, nous consulter.

LE CHAMP D'ACTIVITÉ

SENSIBILITÉ DES GRAMINÉES		SENSIBILITÉ DES DICOTYLÉDONES	
Agrostis jouet du vent		Alchemille	
Avoine à Chapelet		Ammi élevé	
Brome faux seigle		Anthrisque	
Brome stérile	 (4)	Bleuet	 (8)
Folle avoine		Capselle bourse à pasteur	
Pâturin annuel	 (5)	Coquelicot	 (6)
Pâturin commun		Fumeterre	
Ray-grass	 (6)	Gaillet gratteron	
Vulpie		Géraniums	
Vulpin	 (6)	Lamier amplexicaule	
		Lamier pourpre	
		Lampsane	
		Matricaires	 (6)
		Myosotis	
		Pensée	
		Ravenelle	
		Renoncule des marais	
		Renouée liseron	 (7)
		Repousses de colza	
		Repousses de phacélie	
		Rumex de semis	
		Sanve	
		Scandix peigne de Vénus	
		Séneçon	
		Stellaire	 (6)
		Véronique de Perse	
		Véronique feuille de Lierre	

Efficacité > 85%
 85% > efficacité > 60%
 Efficacité < 60%

⁽⁴⁾ En application fractionnée.

⁽⁵⁾ Sur jeunes pâturins à début tallage.

⁽⁶⁾ Sur populations sensibles aux inhibiteurs d'ALS.

⁽⁷⁾ Sur jeunes renouées levées.

⁽⁸⁾ Sur jeunes bleuets.

⁽¹⁾ Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides officiels de bonnes pratiques. Ne pas associer **Octogon™** à un autre antigraminée sur blé dur.

⁽²⁾ En cas de fortes amplitudes thermiques, des marquages temporaires peuvent apparaître sans conséquence sur le rendement final.